

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

和漢薬製剤

腰 専 門

第2類医薬品

「腰専門」は、12種類の生薬を配合し、その成分が総合的に働いて、日常生活の中でさまざまな要因からおこる腰痛をはじめ各種神経痛や関節痛などのつらい痛みや不快感を和らげます。この12種類の生薬配合は弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 胃腸が弱く、下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、下痢

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、血の道症^{注1)}、関節痛、神経痛、肩こり、手足の疼痛^{注2)}・しびれ感

〈効能・効果に関連する注意〉

注1) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

注2) 疼痛（とうつう）とは、ずきずき、じんじん痛むことです。

（裏面もお読みください）

【用法・用量】

次の量を、1日3回食間に白湯又は水で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	15丸	3回
8才以上15才未満	7丸	
5才以上8才未満	5丸	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食間とは食後2～3時間を指します。

【成分・分量】1日量（45丸）中

ニンジン末・・・0.15g トウキ末・・・0.3g ヒシノミ末・・・0.2g
ジオウ末・・・0.3g ジュウヤク末・・・0.3g タクシャ末・・・0.2g
ニンドウ末・・・0.3g コケモモ葉末・・・0.3g ドクカツ末・・・0.2g
センキュウ末・・・0.3g ガジュツ末・・・0.25g ニュウコウ末・・・0.2g
添加物として寒梅粉、炭酸Caを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。）
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

【お問い合わせ先】

天恵堂製薬株式会社「お客様相談窓口」
電 話 0952-97-0036
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234